



Szczecin, dnia 15 listopada 2016 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W SZCZECINIE

Stanisław Paclawski

Wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW AI.9111.2.2016

W związku z wystąpieniem przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u dzikich ptaków w powiecie goleniowskim i na terenie powiatu Świnoujście oraz niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej w Europie Zachodniej Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie przekazuje informacje na temat zagrożenia chorobą.

Wirus HPAI podtyp H5N8 cechuje się wysoką zjadliwością dla drobiu oraz dzikich gatunków ptaków. Zakażeń wirusem u drobiu wodnego (gęsi, kaczki) nie należy wykluczyć nawet przy braku objawów lub przy obecności łagodnych i niespecyficycznych symptomów.


Indyki i kury należą do gatunków najbardziej wrażliwych. U indyków i kur najczęściej obserwuje się nagłe zatrzymanie pobierania paszy i wody, senność osowienie, objawy nerwowe – drgawki, zaburzenia koordynacji ruchowej, u niosek zatrzymanie nieśności.

Wirusy przeżywają w kale przez 30-35 dni w temp. 4°C a w środowisku kurnika 5 tygodni. W zbiornikach wodnych zachowuje zakaźność przez 4 dni w temp. 22°C i ponad 30 dni w temp. 0°C.

Biorąc pod uwagę powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinie wskazuje na konieczność podjęcia działań zapobiegawczych, mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z zagrożeniem zjadliwą grypą ptaków.

Zaleca się :

- **przetrzymywanie drobiu w zamkniętych pomieszczeniach, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;**
- **przechowywanie paszy w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikim ptactwem;**
- **dbałość o zachowanie wszelkich zasad bioasekuracji, rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy,**
- **ograniczenie przemieszczania się osób postronnych, obowiązek używania odzieży ochronnej przez osoby pracujące na fermie.**



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
ul. Orłat Lwowskich 8, 71-340 Szczecin

tel.: (91) 432-41-00, fax: (91) 432-41-01, e-mail: sekretariat@piw.szczecin.pl, www.bip.piw.szczecin.pl


Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym.

Rozprzestrzenianie wirusa ptasiej grypy może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Należy podkreślić, że wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty.

W związku z wysokim ryzykiem zagrożenia chorobą szczególną uwagę zwrócić na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwie poprzez

- rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji.
- ograniczenia w zakresie przemieszczania pojazdów oraz osób np. dostarczających paszę, zbierających jaja, transportujących do ubojni drobiu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Szczecinie

lek. wet. Stanisław Paclawski



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
ul. Orłat Lwowskich 8, 71-340 Szczecin

tel.: (91) 432-41-00, fax: (91) 432-41-01, e-mail: sekretariat@piw.szczecin.pl, www.bip.piw.szczecin.pl